褥瘡対策に関する診療計画書

_	-			ルバルで の。								
氏	名		<u>と</u> 男	女	<u>病 棟</u> 記入医師名			_ 計画作成日				
	年	月 日生	(歳)	記入看護師名			=" =				
		6.1	/// E +=									
	1. 現在 褥瘡の有無。 3.3.4.	なしあり		、坐骨部、尾骨部、腸		—		褥瘡発生日				
	2. 過去	なし あり	(加育部、	、坐骨部、尾骨部、腸	易官部、天転士	が、理部、その↑	也())					
危険因子の評価	<日常生活自立度の低い入院患者> 日常生活自立度 J(1, 2) A(1, 2)			2) B(1, 2)	C(1, 2)				対処			
					できる		できない		7,7,0			
	(イス上 坐位姿勢の保持、除圧)				できる		できない					
	· 病的骨突出				なしあり							
	• 関節拘縮				なしあ				「あり」もしくは 「できない」が1			
	・ 栄養状態低下				なしあり				つ以上の場			
	・皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁)				なしあり				──合、看護計画を ──立案し実施する ──			
	・皮膚の脆弱性(浮腫)				なしあり							
	・皮膚の脆弱性(スキンーテアの保有、既往)				なしあり				+			
	・及席の肥羽生(ヘインー) ア		なし		<i>დ</i> 9		_					
_	<褥瘡に関する危険因子のあ								※両括弧内は点数			
		(0)皮膚損傷・ 発赤なし	(1)持続する	5発赤 (2)真皮まで の損傷	(3)皮下組織ま での損傷	(4)皮下組織を こえる損傷	(5)関節腔、体腔 に至る損傷	(U)深さ判定が 不能の場合				
褥瘡の状態の評価(DE	深さ											
		(0)なし	(1)少量:毎	日の交換を要しない	(3)中等量:1日1	回の交換	(6)多量:1日2回」	以上の交換				
	滲出液											
	大きさ(cm²) 長径×長径に直交する最大径 (持続する発赤の範囲も含む)	(0)皮膚損傷 なし	(3)4未満	(6)4以上 16未満	(8)16以上 36未満	(9)36以上 64未満	(12)64以上 100未満	(15)100以上				
		(0)局所の炎 症	0)局所の炎症 (1)局所の炎症徴候あり (3)局所の明らかな感染徴候あり (9)全身的影響あり						1			
	炎症·感染	徴候なし	徴候なし (創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼 (炎症徴候、膿、悪臭) (発熱など) 痛)									
			7H1 /						合 - 計			
S	肉芽形成	(0)創閉鎖又は 創が浅い為	(1)創面の9 以上を占		(4)創面の10% 以上50%未満	(5)創面の10% 未満を占め	(6)全く形成さ れていない		点			
G	良性肉芽が占める割合	評価不可能	×	を占める	を占める	3	40 00 00					
N R)		(0)なし	(3)柔らかい壊死組織あり (6)硬く厚い密着した壊死組織あり						-			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	ポケット(cm²)	(0)なし	(6)4未満	(9)4以上16未満		(12)16以上36未	満	(24)36以上	1			
	潰瘍面も含めたポケット全周(ポケット の長径×長径に直交する最大径)ー											
	潰瘍面積	 	をについて.	両括弧内の点数を合	計し、「合計点し	記載すること。ナ	ただし、深さの点数	は加えないこと。				
Г	留意する項目		計画の内容									
看護計画	田心,心失口					可回の内台						
	圧迫、ズレカの排除	ベッド上										
	(体位変換、体圧分散寝具、頭部 挙上方法、車椅子姿勢保持等)											
	宇工刀広、甲柯丁安另体付守)											
		/ !										
		イス上										
	スキンケア											
	栄養状態改善											
	リハビリテーション											